

Oligonucleotides tagged with photoinducible redox-active unit

Patent number: DE19901761
Publication date: 1999-07-01
Inventor: HARTWICH GERHARD DR (DE)
Applicant: HARTWICH GERHARD DR (DE)
Classification:
- **International:** C07H21/00; C12N15/11; C12Q1/68; G01N27/26;
C07H21/00; C12N15/11; C12Q; C12Q1/68; G01N27/26;
(IPC1-7): C12N15/11; C07H21/00; C12Q1/68;
G01N27/26
- **European:** C12Q1/68B2H
Application number: DE19991001761 19990118
Priority number(s): DE19991001761 19990118

Report a data error here

Abstract of DE19901761

A nucleic acid oligomer with a photoinducible redox-active unit comprising one or more electron donors and one or more electron acceptors covalently attached is new. Also claimed is (1) a modified conductive surface comprising one or more modified nucleic acid oligomers as above bound to a conductive surface; and (2) a method for electrochemically detecting oligomer hybridisation, comprising contacting a modified conductive surface as above with nucleic acid oligomers.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 199 01 761 A 1

51 Int. Cl.⁶:
C 12 N 15/11
C 12 Q 1/68
C 07 H 21/00
G 01 N 27/26

21 Aktenzeichen: 199 01 761.1
22 Anmeldetag: 18. 1. 99
43 Offenlegungstag: 1. 7. 99

DE 199 01 761 A 1

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

71 Anmelder:
Hartwich, Gerhard, Dr., 80639 München, DE

72 Erfinder:
gleich Anmelder

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

54 Verfahren zur elektrochemischen Detektion von Nukleinsäure-Oligomer-Hybridisierungsereignissen

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur elektrochemischen Detektion von sequenzspezifischen Nukleinsäure-Oligomer-Hybridisierungsereignissen. Dabei dienen DNA-/RNA-/PNA-Oligomer-Einzelstränge, die mit einem Ende an einer leitfähigen Oberfläche gebunden und am anderen, freien Ende mit einer photoinduzierbar redoxaktiven Einheit verknüpft sind, als Hybridisierungsmatrix (Probe). Durch Behandlung mit der zu untersuchenden Oligonukleotid-Lösung (Target) wird ein Teil der Einzelstrang-Oligonukleotide hybridisiert, wodurch die ursprünglich nicht oder nur schwach vorhandene elektrische Kommunikation zwischen der leitfähigen Oberfläche und der photoinduzierbar redoxaktiven Einheit erhöht wird. Somit wird die Detektion eines Hybridisierungsereignisses durch elektrochemische Verfahren wie Voltametrie, Amperometrie oder Leitfähigkeitsmessung ermöglicht.

DE 199 01 761 A 1